

ГЕПАТРОМБИН 30

Hepathrombin 30

Регистрационный номер:

П№013949/01, П№013949/02 от 30.09.2005

Торговое название:

Гепатромбин®

Лекарственная форма:

мазь для наружного применения, гель для наружного применения

Состав

100 г мази содержат:

активные вещества

гепарин натрия 30 000 МЕ, аллантоин 0,30 г, декспантенол 0,40 г;

вспомогательные вещества

бронопрол, карбомер 934, лунацера М, хостафат KW-340-N, левоментол, парафин жидкий, пурцелинол, тегин 515, динатрия эдетат, триэтаноламин, вазелин белый, вода очищенная.

100 г геля содержат:

активные вещества

гепарин натрия 30 000 МЕ, аллантоин 0,250 г, декспантенол 0,250 г;

вспомогательные вещества

карбомер 940, левоментол, динатрия эдетат, триэтаноламин, масло Pini silvestris (сосны обыкновенной), масло Pini pumilionis (кедрового стланика), эфирное масло лимона, сорбит 70% некристаллизующий, изопропиловый спирт, софтиген 767, полисорбат 80, вода очищенная.

Описание

Белая гомогенная мазь с характерным запахом.

Бесцветный прозрачный гель с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

антикоагулянт прямой для местного применения.

Код АТХ: [C05 BA53].

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного применения. Гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противоотечным и противовоспалительным действием, улучшает местный кровоток. Аллантоин оказывает противовоспалительное действие, стимулирует обменные процессы в тканях и способствует пролиферации клеток. Декспантенол улучшает всасывание гепарина, стимулирует грануляцию и эпителизацию тканей.

Показания к применению

Тромбоз, тромбофлебит, варикозное расширение вен; трофические язвы голени (для мази); спортивные травмы, тендовагинит; воспалительные инфильтраты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов (для геля), инфицированные повреждения кожных покровов.

Способ применения и дозы

Наружно. На пораженные участки 1-3 раза в сутки наносят столбик мази длиной 5 см, не втирая. При лечении заболеваний вен препарат применяют в виде повязок с мазью. При трофических язвах мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см.

Гель наносят тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх (при тромбозах и тромбофлебитах массажирование не рекомендуется).

При заболеваниях вен нижних конечностей мазь наносят легкими втирающими движениями по направлению снизу вверх, разовую дозу рекомендуется втирать не полностью, а отдельными порциями.

Побочное действие

Аллергические реакции (кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек).

Форма выпуска

По 40 г мази в алюминиевой тубе. Туба вместе с инструкцией по применению в пачке картонной. По 40 г геля в алюминиевой тубе. Туба вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения:

при температуре 15 - 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек:

без рецепта.

Производитель:

Хемофарм концерн А.Д., Сербия и Черногория